

Дата: _____ 20__ г.

Врач _____

Жалобы: _____

An. morbi _____

An. vitae: Родов _____, аборт(ов) _____, выкидышей _____. П/м _____ Менопауза _____ лет.

Гин. заболевания _____

Контрацепция _____

Об-но: Состояние удовлетворит., t – _____, живот мягкий, безболезненный, болезненный в _____
_____. Стул в норме. Диурез в норме, учащён _____

Молочные железы _____

Status genitalis: Слизистая влагалища бледно-розовая, очаговая гиперемия, яркая гиперемия, сухая, тонкая, легко ранимая _____

Шейка чистая, гиперемирована, эрозия размером _____ см по передней, задней губе _____

Per vaginum: Матка в anteflexio-versio, retroflexio-versio, нормальной величины, увеличена до _____ недель беременности, плотная, мягкая, без/ болезненная, пастозная, бугристая, ограничена в подвижности, подвижная.

Придатки справа не пальпируются, без/ болезненные, пастозные, увеличены до _____ см.

Придатки слева не пальпируются, без/ болезненные, пастозные, увеличены до _____ см.

Матка и придатки детально не пальпируются из-за выраженного п\жирового слоя брюшной стенки.

Своды свободные, безболезненные, болезненные, уплощены, нависают _____

Выделения светлые, слизистые, белые, скудные, умеренные, обильные, _____

ДИАГНОЗ: _____

Дата: _____ 20__ г.

Врач _____

Жалобы: _____

An. morbi _____

An. vitae: Родов _____, аборт(ов) _____, выкидышей _____. П/м _____ Менопауза _____ лет.

Гин. заболевания _____

Контрацепция _____

Об-но: Состояние удовлетворит., t – _____, живот мягкий, безболезненный, болезненный в _____
_____. Стул в норме. Диурез в норме, учащён _____

Молочные железы _____

Status genitalis: Слизистая влагалища бледно-розовая, очаговая гиперемия, яркая гиперемия, сухая, тонкая, легко ранимая _____

Шейка чистая, гиперемирована, эрозия размером _____ см по передней, задней губе _____

Per vaginum: Матка в anteflexio-versio, retroflexio-versio, нормальной величины, увеличена до _____ недель беременности, плотная, мягкая, без/ болезненная, пастозная, бугристая, ограничена в подвижности, подвижная.

Придатки справа не пальпируются, без/ болезненные, пастозные, увеличены до _____ см.

Придатки слева не пальпируются, без/ болезненные, пастозные, увеличены до _____ см.

Матка и придатки детально не пальпируются из-за выраженного п\жирового слоя брюшной стенки.

Своды свободные, безболезненные, болезненные, уплощены, нависают _____

Выделения светлые, слизистые, белые, скудные, умеренные, обильные, _____

ДИАГНОЗ: _____