



САХАРНЫЙ ДИАБЕТ



1 тип инсулин- зависимый

В организме вырабатывается недостаточное количество инсулина, поэтому требуется его дополнительное введение.

2 ТИПА ДИАБЕТА

ФАКТОРЫ РИСКА

- Возраст больше 35 лет
- Избыточный вес
- Малоподвижный образ жизни
- Сахарный диабет у родителей или братьев/сестер
- Вирусная инфекция
- Неизвестные внешние факторы
- Рождение крупного ребенка (более 4 кг)
- Гипертония и сердечно-сосудистые заболевания

2 тип инсулин- независимый

Инсулин вырабатывается в организме в достаточном количестве, но клетки и ткани теряют чувствительность к нему.



Если у Вас один или более факторов риска, сдайте кровь на глюкозу. Сделать это очень просто - достаточно пройти профилактическое обследование и диспансеризацию в поликлинике по месту прикрепления.

НОРМА -
уровень глюкозы натощак
< 6 ммоль/л

ПРЕДДИАБЕТ -
уровень глюкозы натощак
от 6,1 до 6,9 ммоль/л

ДИАБЕТ -
уровень глюкозы
≥ 7,0 ммоль/л

СИМПТОМЫ ДИАБЕТА



Постоянная жажда, сухость во рту

Снижение веса, иногда повышение аппетита



Частая молочница у женщин

Снижение эрекции у мужчин



Ухудшение зрения

Воспалительные процессы, плохо заживающие раны, расчесы на коже



Частое мочеиспускание и увеличение количества мочи за сутки

Повышенная утомляемость, слабость



У вас повышенный уровень сахара в крови или Вы отметили у себя симптомы диабета? Вам необходимо обратиться к врачу!

+
ПОМНИТЕ! Несвоевременное выявление диабета или отсутствие лечения могут привести к серьезным последствиям:

- Сердечно-сосудистым осложнениям (инфаркт, инсульт)
- Снижение зрения, вплоть до слепоты
- Почечной недостаточности
- Гангрене, ампутации конечностей
- Поражение нервной системы